GUÍA DEL MEDICAMENTO
LEQEMBI® (leh-kem'-bi)
(lecanemab-irmb)
para inyección intravenosa o subcutánea

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre LEQEMBI?
LEQEMBI puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- **Anomalías en las imágenes relacionadas con el amiloide o "AIRA". Las AIRA son un efecto secundario que no suele causar síntomas, pero pueden producirse síntomas graves.** Las AIRA pueden ser mortales. Se suelen observar como una inflamación temporal en zonas del cerebro que normalmente se resuelve con el tiempo. Algunas personas también pueden tener pequeños puntos de sangrado en o dentro de la superficie del cerebro y, con poca frecuencia, pueden producirse áreas más grandes de sangrado en el cerebro. La mayoría de las personas que presentan AIRA no tienen síntomas; sin embargo, algunas personas podrían tener síntomas, como los siguientes:

  - dolor de cabeza
  - confusión
  - mareos
  - cambios en la vista
  - náuseas
  - dificultad para caminar
  - convulsiones
  - dificultad para hablar
  - debilidad muscular

Algunas personas tienen un factor de riesgo genético (portadores homocigotos del gen apolipoproteína E) que puede provocar un aumento del riesgo de AIRA. Consulte a su proveedor de atención médica sobre realizarse pruebas para ver si tiene este factor de riesgo.

Usted podría tener un mayor riesgo de presentar hemorragia en el cerebro si toma medicamentos para reducir la formación de coágulos de sangre (medicamentos antitrombóticos) mientras recibe LEQEMBI.

Su proveedor de atención médica le pedirá que se realice imágenes por resonancia magnética (IRM) antes y durante su tratamiento con LEQEMBI para comprobar si tiene AIRA.

Debe llevar con usted información que indique que está recibiendo LEQEMBI, que puede causar AIRA, y que los síntomas de AIRA pueden ser parecidos a los síntomas de un accidente cerebrovascular.

Llame a su proveedor de atención médica o acuda inmediatamente a la sala de emergencias del hospital más cercano si tiene alguno de los síntomas mencionados anteriormente.

Existen registros que reúnen información sobre tratamientos para la enfermedad de Alzheimer. Su proveedor de atención médica puede ayudarle a inscribirse en estos registros. Para obtener más información, llame a Eisai al 888-274-2378.

¿Qué es LEQEMBI?
LEQEMBI es un medicamento recetado que se utiliza para tratar a personas con la enfermedad de Alzheimer.
Se desconoce si LEQEMBI es seguro y eficaz en niños.

No reciba LEQEMBI si experimenta lo siguiente:

- Ha tenido reacciones alérgicas graves al lecanemab-irmb o a cualquiera de los ingredientes. Consulte el final de esta Guía del Medicamento para revisar la lista completa de ingredientes de LEQEMBI o LEQEMBI IQLIK.

Antes de recibir LEQEMBI, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido si usted:

- Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si LEQEMBI podría causarle daño a su bebé en gestación. Informe a su proveedor de atención médica, si queda embarazada durante su tratamiento con LEQEMBI.
- Está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si lecanemab-irmb (el ingrediente activo de LEQEMBI) pasa a la leche materna. Consulte a su proveedor de atención médica acerca de la mejor manera de alimentar a su bebé mientras usted recibe LEQEMBI.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos con o sin receta, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.
Especialmente, informe a su proveedor de atención médica si toma medicamentos para prevenir la formación de coágulos de sangre (medicamentos antitrombóticos, como la aspirina). Si no está seguro, consulte a su proveedor de atención médica para obtener una lista de estos medicamentos.
Conozca los medicamentos que toma. Anótelos en una lista para mostrársela a su proveedor de atención médica y al farmacéutico cuando le receten un nuevo medicamento.

¿Cómo recibiré LEQEMBI?

Cuando se administra en una vena (por vía intravenosa)

- LEQEMBI es administrado por un proveedor de atención médica a través de una aguja colocada en la vena del brazo (infusión intravenosa [i.v.]).
- Su proveedor de atención médica le dirá con qué frecuencia debe recibir LEQEMBI. Cada infusión durará aproximadamente 1 hora.
- Si se salta una infusión de LEQEMBI, debe recibir la siguiente dosis lo antes posible.

Cuando se administra bajo la piel (por vía subcutánea)
Lea las Instrucciones de uso detalladas que vienen con LEQEMBI IQLIK para obtener información sobre la forma correcta de preparar y administrar sus inyecciones de LEQEMBI IQLIK en el hogar.

- Después de la administración de al menos 2 dosis consecutivas de LEQEMBI IQLIK con la orientación directa de su proveedor de atención médica, se decidirá si es adecuado que sea usted o un cuidador quien administre LEQEMBI IQLIK.
- Su proveedor de atención médica le mostrará cómo usar LEQEMBI IQLIK y le dirá con qué frecuencia debe usarlo. Use LEQEMBI IQLIK exactamente como le indique su proveedor de atención médica.
- LEQEMBI IQLIK se administra en forma de inyección bajo la piel (inyección subcutánea) en la parte delantera de los muslos o en la zona del estómago (abdomen) aplicada por usted o un cuidador. Un proveedor de atención médica o un cuidador también pueden administrarle la inyección de LEQEMBI IQLIK en la parte superior trasera del brazo.
- No aplique la inyección en lunares, cicatrices, moretones, tatuajes o en zonas donde la piel esté enrojecida, endurecida, sensible o lesionada.
- Utilice un lugar de inyección diferente a 1 pulgada del lugar anterior, como mínimo, cada vez que use LEQEMBI IQLIK.
- No aplique la inyección en el área de 2 pulgadas alrededor del ombligo.
- Si omite una dosis de LEQEMBI IQLIK, inyecte la dosis omitida lo antes posible hasta 6 días después de la dosis omitida. Continúe (reanude) su siguiente inyección el día programado habitualmente.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de LEQEMBI?
LEQEMBI puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- **Consulte "¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre LEQEMBI?"**
- **Reacciones alérgicas graves. Se ha producido hinchazón de la cara, los labios, la boca o la lengua, urticaria o dificultad para respirar durante el tratamiento con LEQEMBI. Informe a su proveedor de atención médica y obtenga asistencia médica inmediata si tiene algún síntoma de reacción alérgica grave durante o después del tratamiento con LEQEMBI.**
- **Reacciones relacionadas con la infusión.** Las reacciones relacionadas con la infusión son un efecto secundario frecuente de la inyección de LEQEMBI en una vena (por vía intravenosa), y pueden ser graves. Recibirá la infusión en un centro de atención de la salud. Si se produce una reacción grave a la infusión mientras recibe LEQEMBI, se puede interrumpir la infusión. También pueden producirse reacciones graves a la infusión después de finalizar la infusión. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene alguno de estos síntomas durante una infusión o después de finalizar la infusión de LEQEMBI:
  - fiebre
  - síntomas similares a los de la gripe (escalofríos, dolores corporales, temblores y dolor articular)
  - náuseas
  - vómitos
  - mareos o aturdimiento
  - cambios en su ritmo cardíaco o fuertes palpitaciones
  - dificultad para respirar o falta de aliento
  - cambios en la presión arterial

  Si tiene una reacción relacionada con la infusión, su proveedor de atención médica puede administrarle medicamentos antes de las infusiones de LEQEMBI para reducir la probabilidad de que sufra una reacción relacionada con la infusión. Estos medicamentos pueden incluir antihistamínicos, medicamentos antiinflamatorios o esteroides.
- **Reacciones relacionadas con la inyección. Pueden producirse reacciones relacionadas con la inyección de LEQEMBI bajo la piel (inyección subcutánea con LEQEMBI IQLIK)**. Puede observarse enrojecimiento, hinchazón, calor, dolor, picazón, erupción cutánea, protuberancias, hematomas y acumulación de sangre bajo la piel en el lugar de inyección. También pueden presentarse escalofríos, dolor de cabeza, fatiga o fiebre después de una inyección. Informe a su proveedor de atención médica si presenta cualquiera de estos síntomas durante o después de una inyección.

Entre los efectos secundarios más frecuentes de LEQEMBI, se incluyen los siguientes:

- reacciones relacionadas con la infusión de LEQEMBI inyectado en una vena
- inflamación en áreas del cerebro, con o sin pequeños puntos de sangrado en o dentro de la superficie del cerebro (AIRA)
- dolor de cabeza

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de LEQEMBI. Para obtener más información, pregunte a su proveedor de atención médica o farmacéutico.
Llame al médico para obtener asesoramiento acerca de los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) al teléfono 1-800-FDA-1088.

¿Cómo debo almacenar LEQEMBI IQLIK?

- Almacene los autoinyectores de LEQEMBI IQLIK en un refrigerador a entre 36 °F y 46 °F (de 2 °C a 8 °C).

- No congelar.
- Mantenga los autoinyectores de LEQEMBI IQLIK en la caja original hasta que estén listos para usar, para protegerlos de la luz.
- LEQEMBI IQLIK se puede almacenar a temperatura ambiente hasta 77 °F (25 °C) durante un máximo de 14 días en la caja original. No lo vuelva a guardar en el refrigerador si se ha llevado a temperatura ambiente.
- No agite LEQEMBI IQLIK.
- Deseche (elimine) el LEQEMBI IQLIK que esté vencido o si no se almacenó de la manera correcta.

Mantenga LEQEMBI IQLIK y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Información general sobre el uso seguro y eficaz de LEQEMBI.

Los medicamentos a veces se recetan para fines diferentes de los que se mencionan en la Guía del Medicamento. No use LEQEMBI para una afección para la cual no fue recetado. No les dé LEQEMBI a otras personas, incluso si tienen los mismos síntomas que usted. Hacer esto puede causarles daño.

Puede pedirle a su farmacéutico o proveedor de atención médica información sobre LEQEMBI que esté escrita para profesionales de la salud.

¿Cuáles son los ingredientes de LEQEMBI?

Ingrediente activo: lecanemab-irmb.

Ingredientes inactivos (por vía intravenosa): clorhidrato de arginina, histidina, clorhidrato de histidina monohidrato, polisorbato 80 y agua para inyección.

Ingredientes inactivos (por vía subcutánea): clorhidrato de arginina, histidina, clorhidrato de histidina monohidrato, polisorbato 80 y agua para inyección.

Fabricado por:
Eisai Inc.
Nutley, NJ 07110
Licencia de los EE. UU. N.º 1862
LEQEMBI® es una marca comercial registrada de Eisai R&D Management Co., Ltd.
LEQEMBI IQLIK® es una marca comercial registrada de Eisai R&D Management Co., Ltd.
© 2026 Eisai Inc. y Biogen
Para obtener más información, visite www.LEQEMBI.com o llame al 1-888-274-2378.

Esta Guía del Medicamento ha sido aprobada por la FDA de los EE. UU. Actualizado: 7/2026